

Étude Basis

Quelles sont les pratiques des médecins généralistes dans 5 pays européens concernant la prise en charge des problèmes d'alcool ?

Didier Duhot

Pour le comité de pilotage BASIS

JA Arbesu Prieto, M Beier, A Rossi, B Schulte, J Zarco, H-J Aubin, M Bachmann, C Grimm, L Kraus, J Manthey, E Scafato, A Gual, J Rehm

Lien d'intérêt : cette étude a été cofinancée par le laboratoire Lundbeck



SIMG
SOCIETÀ ITALIANA DI
MEDICINA GENERALE
E DELLE CURE PRIMARIE



CMG 2015 – Paris 4-2 avril 2016




Contexte

- ✓ 10 à 15 % de patients ayant des problèmes avec l'alcool
- ✓ Alcool responsable d'une morbi-mortalité importante
- ✓ 1,2 % de prise en charge en MG (OMG 2009)
- ✓ L'étude BASIS (Baseline Alcohol Screening and Intervention Survey) a été initiée par un groupe de MG afin de :
 - décrire la prise en charge des patients ayant un problème avec l'alcool dans 5 pays européens : Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume Uni
 - Prise en charge de l'HTA
 - Dépistage des problèmes d'alcool
 - Prise en charge des problèmes d'alcool

Méthode


- ✓ Enquête multicentrique par internet : Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume Uni
- ✓ Dépistage = consommation à risque et dépendance
- ✓ 35 questions, 10-15 minutes
- ✓ Traduction dans les 5 langues
- ✓ 45 000 MG via les associations partenaires
- ✓ Durée de l'étude 29 septembre au 30 novembre 2015
 - Réponses complètes à la clôture : 2 468
- ✓ Sont présentées ici les résultats préliminaires (sur 1 903 réponses)

Nombre de réponses par pays



Facteurs de risque pour l'HTA

✓ Choisir les 3 plus importants facteurs de risque pour l'HTA




Dépistage des problèmes d'alcool

Nombre de patients par jour	Moyen = 34,4 (SD = 23,4)
Patients hypertendus	29,9 % (CI : 29,2-30,6 %)
Nombre de patients hypertendus non dépistés pour l'alcool (sur 10)	Moyen = 4,7 (SD = 3,3)
MG ne dépistant jamais l'alcool chez les hypertendus	8,7 % (CI : 7,5-10,0 %)


Dépistage des problèmes d'alcool

Nombre moyen de patients dépistés pour l'alcool pour 10 hypertendus par pays




Prise en charge des problèmes d'alcool

Quelle prise en charge des patients hypertendus ayant une consommation d'alcool à risque par pays




Prise en charge des problèmes d'alcool

Quelle prise en charge des patients hypertendus dépendant à l'alcool par pays




Confiant pour la prise en charge

MG se sentant confiants pour la prise en charge de...



Enseignement à l'université

✓ A l'université l'alcool ou l'HTA * ont été traités ...



Conclusions

- ✓ L'alcool n'est pas ressenti par les MG comme un des principaux facteurs de risqué d'HTA
- ✓ Différences importantes du dépistage selon les pays
- ✓ Différences de prise en charge de l'alcool selon les pays
- ✓ Poids du système de santé et de son organisation et optimisation du temps de la consultation
- ✓ Places des problèmes d'alcool dans l'enseignement

Merci pour votre attention

Nous tenons à remercier
tous les médecins ayant participé à l'étude
Le comité de pilotage

Jakob Manthey, Gerrit Gmel et Michael Bachmann

