DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN MÉDECINE

LA CONTRIBUTION DES DIFFÉRENTS TEMPS DE LA CONSULTATION DANS L'ÉTABLISSEMENT DU DIAGNOSTIC EN MÉDECINE GÉNÉRALE

Soutenue publiquement le 31 mai 2016

Amina Fouzai - Jaaouani

Née le 18 février 1987

Président de thèse : Pr Jean Pierre Aubert

Directeur de thèse : Dr Didier Duhot

Introduction

- Soins primaires
 - 1^{er} contact du patient avec le système de santé
 - Population non sélectionnée
 - Censés pouvoir répondre à la quasi totalité des problèmes de santé
 - Mis en avant par l'OMS depuis 1978 dans le cadre de la déclaration d'Alma-Ata concernant la stratégie de santé pour tous

Consultation de médecine générale

=

élément clé des soins primaires en France

Introduction

- La consultation médicale
 - *Démarche diagnostique*
 - *Démarche décisionnelle*
- Temps moyen: **16 min**
- Démarche diagnostique
 - *Recueil des plaintes du patient*
 - *Anamnèse*
 - *Examen clinique*
 - *Prescription et lecture d'examens complémentaires*

Introduction

- Contexte actuel
 - ↘ du nombre de médecins généralistes dans 80 départements français entre 2007 et 2015
 - ↗ de la demande de soins
 - ↗ des dépenses de santé: 243 milliards d'euros (2012)
- Comment optimiser la consultation du médecin généraliste ?

Objectifs

Objectif primaire

Dans quelle mesure les différents temps de la consultation médicale contribuent-ils au diagnostic en consultation de médecine générale ?

Objectif secondaire

L'ordre du recueil des informations en consultation influent-il sur le diagnostic final ?

Matériel et Méthodes

- Revue de la littérature
- Deux bases de données : Pubmed, Refdoc et Littérature grise

Equation de recherche Pubmed

(Physical Examination [mh:noexp] OR Medical history Taking [mh:noexp])
AND Diagnosis [mh:noexp] AND Humans[mh]

Matériel et Méthodes

Critères d'inclusion

- Les articles de 1975 à avril 2014
- Articles francophones et anglophones
- Articles traitant des différents temps de consultation médicale
- Etudes cliniques prospectives
- Réalisées en clinique de soins primaires ou consultation de médecine générale

Critères d'exclusion

- Articles dont le texte n'a pu être trouvé
- Articles non anglophones et non francophones
- Articles avant ou après les bornes
- Articles portant sur d'autres contextes de soins

Flow Chart

Résultats (1/8)

- 9 articles inclus
- Etudes prospectives
- Consultation de soins primaires
 - Médecins généralistes
 - Internistes ambulatoires
 - Internes ou Résidents en médecine

1 ^{er} auteur	Année	Type d'étude	Pays
Hampton R	1975	prospective	NP*
Sandler G	1980	prospective	NP
Gruppen LD	1988	prospective	USA
Peterson M	1992	prospective	USA
Gruppen LD	1993	prospective	USA
Bergus G	1998	prospective	USA
Roshan M	2000	prospective	INDE
Tomoko Tsukamoto	2009	prospective	JAPON
Sibbald	2011	prospective	USA

Tableau 1 : répartition chronologique et géographique des articles inclus dans l'étude.

Résultats (2/8)

Méthodologie des différentes études

Etudes sur médecins généralistes et internistes (N=6)	Etudes sur les étudiants (N=3)
<p data-bbox="50 572 571 611">Consultation tout venant</p> <p data-bbox="50 686 884 839">Recueil des différentes hypothèses diagnostiques après chacun des temps de la consultation médicale</p> <ul data-bbox="50 915 707 1186" style="list-style-type: none">• Plainte principale du patient• Anamnèse• Examen clinique• Recueil des examens complémentaires <p data-bbox="50 1258 788 1296">+/- Score de confiance 0 ou 1 à 10</p> <p data-bbox="50 1368 658 1406">Une étude sur 1 cas clinique</p>	<p data-bbox="985 572 1779 611">Cas témoins présentés aux étudiants</p> <p data-bbox="985 686 1819 839">Recueil des différentes hypothèses diagnostiques après chacun des temps de la consultation médicale</p> <ul data-bbox="985 915 1642 1186" style="list-style-type: none">• Plainte principale du patient• Anamnèse• Examen clinique• Recueil des examens complémentaires <p data-bbox="985 1258 1769 1353">+/- Score de confiance 0 à 100 % de certitude</p>

Plainte principale + Anamnèse

??	Etablissement du diagnostic après plainte principale et anamnèse du patient (%)
Hampton	82,5
Sandler	56,0
Peterson	76,0
Gruppen (soins primaires)	95,0
Gruppen (étudiants)	87,0
Sibbald	80,0
Roshan	78,5
Tsukamoto	71,0

Contribution de la plainte principale et de l'anamnèse dans l'établissement du diagnostic en consultation de soins primaires

Majorité des auteurs ont regroupé la plainte principale et l'anamnèse pour exposer leurs résultats

Résultats concordants malgré des lieux et époques différentes

Gruppen → distinction entre les diagnostics établis après :

- Plainte principale : 79 et 70 %
- Anamnèse : 16 et 16,5 %

71 % de nouvelles hypothèses diagnostiques après l'anamnèse selon l'étude de Gruppen

Temps les plus contributifs quelque soit le domaine de pathologie (Sandler)

Résultats (4/8)

Examen clinique

??	Etablissement du diagnostic après examen clinique du patient (%)
Hampton	8,7
Sandler	17,0
Peterson	12,0
Gruppen (soins primaires)	<1
Gruppen (étudiants)	1,4
Roshan	8,2
Tsukamoto	18,3

Rôles identifiés de l'examen clinique

- Génération d'hypothèses diagnostiques : 13 % des cas (*Gruppen*)
- Elimination des hypothèses : 16 % des cas (*Gruppen*)
- Accroissement du score de confiance

Contribution de l'examen clinique dans l'établissement du diagnostic en consultation de soins primaires

Résultats(5/8)

Examens complémentaires

Établissement	Contribution des examens complémentaires à l'établissement du diagnostic après consultation de soins primaires (%)
Hampton	5,0
Sandler	5,0
Peterson	11,0
Gruppen (soins primaires)	< 1
Roshan	13,0
Tsukamoto	10,0

Contribution des examens complémentaires dans l'établissement du diagnostic en consultation de soins primaires

Hampton

Sur 80 patients, 478 examens complémentaires prescrits
→ utiles au diagnostic dans 5 % des cas

Gruppen

Prescription d'examens complémentaires chez 22 % des patients
→ utiles au diagnostic dans moins de 1% des cas

Sandler

Coût des examens complémentaires réalisés sur les patients dont le diagnostic avait déjà été établi auparavant = 13 000 Dollars US sur une période de 2 ans

Résultats (6/8)

Score de confiance

Score de confiance

Le score de confiance est une évaluation donnée par le médecin interrogé pour classer ses différentes hypothèses diagnostiques

Il s'évalue de façon croissante :

- à partir de 0 ou 1, traduisant une hypothèse diagnostique peu probable**
- à 10, hypothèse fortement probable**

Ce score a permis, dans les différents articles qui l'utilisent, de mettre en avant l'évolution du niveau de certitude du médecin face à son ou ses hypothèses diagnostiques

Evolution croissante du score de confiance au fil des temps de la consultation

Résultats (7/8)

Erreurs diagnostiques

Table 4. Relative risk of final misdiagnosis based on consideration of the correct diagnosis after history taking or physical examination (N=94)

Correct diagnosis considered	Final correct diagnosis		Relative risk (confidence interval)
	Yes	No	
After history taking			
Yes	49	8	5.0 (2.5-9.8)
No	11	26	
After physical examination			
Yes	55	10	5.4 (3.0-9.7)
No	5	24	

*The relative risk is the extent to which failing to consider the correct diagnosis in differential diagnosis after taking the history or performing physical examination increased the possibility of final misdiagnosis.

Importance de la plainte principale et de l'anamnèse

Si le diagnostic n'est pas établi après ces 2 temps

→ Risque d'erreur diagnostique final multiplié par 5

IC 95 %

Résultats (8/8)

Impact de l'ordre du recueil des informations médicales

Etude de **Bergus** prospective portant sur un cas d'infection urinaire

Les 2 groupes ont reçu la même plainte principale du patient: inconfort urinaire chez une femme jeune → diagnostic d'infection urinaire chez 67 % des médecins

1^{er} groupe recevant anamnèse et examen clinique avant examen urinaire douteux :

Confirmation du diagnostic chez 50,9 % des médecins

Remise en cause du diagnostic chez 16,4 % des médecins

2^e groupe recevant examen urinaire douteux avant anamnèse et examen clinique :

Confirmation du diagnostic chez 59,1 % des médecins

Remise en cause du diagnostic chez 8,6 % des médecins

$p = 0.04$

Discussion (1/2)

- Résultats concordants malgré des lieux et époques différentes :
La plainte principale et l'anamnèse sont les temps les plus contributifs au diagnostic en médecine générale
- Quelques critiques
 - Méthodologie: relecture, 10 articles non trouvés
 - Pas d'étude française
 - La notion de plainte principale n'existe pas en France
 - Seulement 5 études sur des médecins généralistes
 - Disparité entre les résultats trouvés concernant la contribution de la plainte principale + anamnèse

Discussion (2/2)

- Examen clinique et examens complémentaires :
Rôle dans la réduction de l'incertitude diagnostique
- Quelques critiques
 - Pas d'étude statistique sur le score de confiance
 - Notion de cumul des différents scores de confiance non reproductible en pratique
- Examens complémentaires coûteux peu utiles et potentielle source de doute diagnostic

Comment optimiser la consultation du médecin généraliste

- Temps d'écoute active plus important
- Examen clinique ciblé sur les problèmes énoncés par le patient
- Prescription d'examens complémentaires à limiter
- Comment y parvenir
 - Meilleure organisation du temps de consultation
 - Enseignement plus centré sur la clinique
 - Adaptation du mode de rémunération

Perspectives ...

- Etudes sur la contribution des différents temps de la consultation de médecine générale dans notre système de soins
- Etude du coût des examens complémentaires prescrits inutilement en médecine générale en France
- Etude sur l'influence d'un résultat d'examen complémentaire douteux dans l'établissement du diagnostic
- Etudes statistiques sur le niveau de certitude diagnostique au fil des temps de la consultation

Merci de votre attention

Amina Fouzai - Jaaouani
Faculté de Médecine Paris 7 Diderot